

Glwcos Gwaed Isel (Hypoglycaemia)



Ystyr hypoglycaemia yw glwcos gwaed isel. Fe'i gelwir yn aml yn 'hypo' ac fe'i diffinnir fel lefel glwcos gwaed sy'n **llai na 4.0 mmol/l**. Nid yw rhai pobl yn teimlo symptomau 'hypo' ar y lefel hon ond mae'n bwysig trin unrhyw lefel sy'n llai na 4mmol/l.

Arwyddion a symptomau glwcos gwaed isel:

Mae llawer o arwyddion a symptomau gwahanol o glwcos gwaed isel ac ni fydd pawb yn profi nhw i gyd. Isod ceir rhai o'r arwyddion a symptomau a allai fod yn brofiadol.

- Teimlo'n sigledig
- Teimlo'n llwglyd
- Edrych yn welw
- Cur pen / pen tost
- Poen stumog
- Newid mewn hwyliau
- Diffyg canolbwyntio
- Teimlon ddi-ben-draw / chwil
- Teimlo'n ddryslyd
- Teimlo'n ansefydlog
- Siarad yn aneglur
- Coesau jeli neu goesau blinedig



Achosion posibl glwcos gwaed isel:

- Ymarfer corff
- Gor amcangyfrif maint o garbohydriad yn pryd o fwyd neu snac (ac felly cymryd mwy o inswlin na sydd ei hangen)
- Ddim yn gorffen pryd o fwyd ar ôl rhoi inswlin
- Salwch
- Mynd amser hir heb fwyta
- Straen a phryder



Gall hypos dros nos ddigwydd. Siaradwch â'ch tîm os yw hyn yn peri pryder i chi.

Cofiwch, os oes unrhyw arwydd neu symptomau rhaid:

- Gwirio lefel glwcos y gwaed
- Os yw'n is na 4mmol/l, cymerwch gamau ar unwaith
- Bydd triniaeth yn dibynnu ar bwysau y plentyn neu berson ifanc. Trowch y tudalen ar gyfer mwy o wybodaeth



Triniaeth glwcos gwaed isel: Therapi Pen InSwlin

YSGAFN	CYMEDROL	DIFRIFOL
Yn gallu hunanreoli (Yn ymwybodol ac yn gallu llyncu)	Angen rhywfaint o help i reoli	Methu â hunanreoli

YSTOD PWYSAU'R CORFF					
Llai na 15kg	15kg-30kg	30kg-50kg	Dros 50kg	Gwasgu gel glwcos yn araf i mewn i'r ceg. Dylid llyncu y gel glwcos.	- Angen cymorth brys - Rhowch y PPI yn y safle adferiad - Cyswllt ar gwasanaeth brys - Callwch ddefnyddio Glucagon Hypo cit (dim ond os ydych wedi cael hyforddiant i wneud hynny)
Rhowch glwcos 5g e.e.	Rhowch glwcos 10g e.e	Rhowch glwcos 15g e.e	Rhowch glwcos 20g e.e		
55ml Lucozade ynni	110ml Lucozade ynni	170ml Lucozade ynni	220ml Lucozade ynni		
20ml sudd glwcos Lift	40ml sudd glwcos Lift	60ml sudd glwcos Lift	80ml sudd glwcos Lift		
1 a hanner o dabledi glwcos	3 o dabledi glwcos	5 o dabledi glwcos	6 o dabledi glwcos		
1 losin jeli sy'n cynnwys glwcos	2 losin jeli sy'n cynnwys glwcos	3 losin jeli sy'n cynnwys glwcos	4 losin jeli sy'n cynnwys glwcos		
1 a hanner Starbursts	3 Starbursts	5 Starbursts	6 Starbursts		
50ml cola	100ml cola	150ml cola	200 ml cola		
Hanner tiwb o gel glwcos	1 tiwb o gel glwcos	1 a hanner tiwb o gel glwcos	2 tiwb o gel glwcos		

Arhoswch 15 munud ac ailwirio lefelau glwcos yn y gwaed
Os yw glwcos yn y gwaed dal i fod yn llai na 4.0mmol/l, cymerwch triniaeth glwcos arall. Nid yw'n anghyffredin gorfod ailadrodd hyn fwy nag unwaith

Byddwch yn dechrau gwella mewn 15 i 30 munud

Pan fydd lefel glwcos yn y gwaed yn uwch na 4.0mmol/l efallai y bydd angen byrbryd carbohydrad *(10g) e.e. darn bach (10g) o ffrwyth, 1 bisged blaen (digestive), 1 bisged ceirch (hobnob), 2 fisged te cyfoethog, 1 rholyn ffigys, 1 pecyn o mini cheddars neu 1 bocs o resins.

**Gall hyn ddibynnu ar eich cynllun gweithgareddau dros yr oriau nesaf*